

Hoja De Datos De Seguridad (HDS)

NOMBRE COMERCIAL: SPOLVOTRICH

SPOLVOTRICH

SECCION I

Datos generales de las HDS:

a) Fecha de elaboración: 22-01-2021

b) Fecha de actualización: 22-01-2021

c) Nombre o razón social de quien elabora la HDS: Microtech Services Cia. Ltda.

d) Datos generales del fabricante: Microtech Services Cia. Ltda. es una compañía privada especializada en la investigación y producción de organismos benéficos y de alternativas biotecnológicas para el control de plagas y enfermedades, así como en la producción de bioestimulantes y nutrientes.

País: Ecuador

Provincia: Pichincha

Ciudad: Quito

Dirección: Cununyacu, calle 02 de agosto No. 2. Tumbaco

Telefax: 02 2100141

Celular: 0987472675

EMAIL: aleon@microtech.ec

e) Comunicarse en caso de emergencia, con:

Dr. Antonio Leon-Reyes: 0987472675.

SECCION II

II.1 Datos del bioformulado sólido:

a) Nombre ingrediente activo: *Trichoderma harzianum*, *T. asperellum*

b) Nombre comercial: SPOLVOTRICH

c) Registro AGROCALIDAD: en trámite

d) Nombre Común: Hongo benéfico del suelo

e) Tipo de sustancia: Microorganismos benéficos

Otros datos relevantes. *Trichoderma* es un tipo de hongo anaerobio facultativo (puede vivir en presencia o ausencia de oxígeno) que se encuentra de manera natural en un número importante de suelos agrícolas y otros tipos de medios. Pertenece a la subdivisión Deuteromycetes que se



caracterizan por no poseer, o no presentar un estado sexual determinado. De este microorganismo existen más de 30 especies, todas con efectos benéficos para la agricultura y otras ramas.

Este hongo se encuentra ampliamente distribuido en el mundo, y se presenta en diferentes zonas y hábitat, especialmente en aquellos que contienen materia orgánica o desechos vegetales en descomposición, así mismo en residuos de cultivos, especialmente en aquellos que son atacados por otros hongos.

Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de altas densidades de raíces, las cuales son colonizadas rápidamente por estos microorganismos. Esta capacidad de adaptación a diversas condiciones medioambientales y sustratos confiere a *Trichoderma* la posibilidad de ser utilizado en diferentes suelos, cultivos, climas y procesos tecnológicos.

II.2 Acción Fitosanitaria:

SPOLVOTRICH contiene varias cepas antagonista naturales selectiva de *Trichoderma harzianum*, *T. asperellum*, *T. koningii* que a más de su acción bioestimulante controla a hongos fitopatógenos de los géneros: *Fusarium*, *Pythium*, *Sclerotinia*, *Rhizoctonia*, *Sclerotium cepivorum*, *Alternaria*, *Botrytis*, *Phytophthora*, *Mycosphaerella*, *Pyricularia oryzae*, *Verticillium* en cultivos de Hortalizas, Frutales, Flores y Ornamentales.

Trichoderma, posee aislamientos con poderes antibióticos, los cuales actúan contra varios microorganismos fitopatógenos. Se comporta como saprofito en la rizósfera, siendo capaz de destruir residuos de plantas infectadas por patógenos. Se considera que su acción es antagonista, siendo capaz de sacar el mejor provecho por su alta adaptación al medio y por competir por el sustrato y por espacio. *Trichoderma*, actúa por medio de una combinación de competencia por nutrientes, producción de metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas y micoparasitismo.

II.3 Aplicación:

La aplicación de *Trichoderma* se puede realizar con los métodos de espolvoreo.

Aplicación 1 vez semanal durante el invierno.

Período aplicación cosecha: No hay restricción.

II. 4 Dosis: 5 kg/ha.

II. 5 Concentración: 2.5×10^8 CFU/gr de producto.

CFU: Colony Forming Unit (unidades formadoras de colonias)



SECCION III

Identificación de la sustancia:

III.1 Clasificación de los grados de riesgo:

- a) a la salud: No es tóxico a los humanos en dosis recomendadas (pruebas toxicológicas)
- b) de inflamabilidad: NULO
- c) de reactividad: NULA

SECCION IV

IV. 1 Propiedades físicas y químicas del bioformulado:

- a) Estado físico: POLVO
- b) Color: VERDE CLARO
- c) Olor: FERMENTESIBLE
- d) Pureza: 100%
- e) Suspensión en agua: ALTA
- f) Porcentaje de volatilidad: ALTA

SECCION V

V.1. Riesgos de fuego o explosión: NULOS

SECCION VI

Datos de reactividad:

VI.1 Compatibilidad SPOLVOTRICH

SPOLVOTRICH es compatible con herbicidas, insecticidas químicos, fertilizantes de reacción ácida e insecticidas biológicos cuya formulación sea a base de hongos, no es compatible con fungicidas, ni con productos desinfectantes del suelo. *Trichoderma* spp es compatible con insecticidas cuyo ingrediente activo es la cipermetrina y metamidofos. Varios ensayos demuestran la incompatibilidad del hongo *Trichoderma harzianum* frente a fungicidas que contengan como principio activo: iprodione, propamocarb, benomyl, tiabendazol y carbendazim, por otra parte se reporta que el biofungicida tolera a los fungicidas con ingredientes activos como captan y clorotalonil.

SECCION VII

Riesgos a la salud y primeros auxilios.

VII.1 Toxicidad:

Toxicidad aguda: DL50 oral: no definida DL50 dermal: no definida.



Toxicidad EPA: IV (formulación): Síntomas de intoxicación: Está documentado que este producto es selectivo para hongos fitopatógenos, no provocando perjuicios a otros seres vivos. Todos los estudios de toxicidad y patogenicidad realizados por Microtech están basados en los siguientes documentos: Environmental Protection Agency. USA. 2001. Microbial Pesticide Test Guidelines. OPPTS 885; The Good laboratory Practice Standards Part 160, Title 40 Code of Federal Regulations CFR, 1999; Principles of Good laboratory Practice standards OECD. 1999 En Official Journal of the European Communities, L 77/9-33. Todos los materiales que componen el producto formulado líquido no son tóxicos y están reportados por la Environmental Protection Agency en sus hojas de seguridad.

Toxicidad / Patogenicidad aguda oral en ratas. La cepa de *Trichoderma harzianum* no es patógena, infectiva ni tóxica en ratas, cuando estas son dosificadas por vía oral con 1×10^8 conidios del hongo por animal. La evacuación de la mayoría de los conidios ocurre en la primera semana después de la administración. Las esporas de *T. harzianum* ingeridas por el animal no tienen ningún efecto dañino sobre los órganos, ni tejidos, ni causan ninguna pérdida de peso ni muerte en los animales durante la prueba.

Toxicidad / Patogenicidad aguda pulmonar en ratas. La cepa de *Trichoderma harzianum* no es patógena, infectiva ni tóxica en ratas, cuando estas son expuestas por instilación traqueal a una dosis sencilla de 1×10^8 conidios por animal. No se observan lesiones en los pulmones de ninguno de los sexos, tampoco se observa ningún tipo de infección en los tejidos. Las esporas de *Trichoderma* inhaladas por el animal no tienen ningún efecto dañino sobre los órganos, ni tejidos, ni causan ninguna pérdida de peso ni muerte en los animales durante la prueba.

Sensibilidad cutánea en ratas. El producto SPOLVOTRICH, que contiene las cepas de *Trichoderma* no es patógeno, infectivo, ni tóxico en ratas cuando a estos se les administra repetidamente sobre la piel. No se presenta dermatitis de contacto alérgico, ni ninguna reacción cutánea de tipo inmunológico generada por el contacto repetitivo de la formulación sobre la piel.

VII.2 Sustancia considerada como:

- a) Carcinogénica: NO
- b) Mutagénica: NO
- c) Teratogénica: NO

Antídoto: no definido.

Tratamiento médico: sintomático.

SECCION VIII

Indicaciones en caso de fuga o derrame.

VII.1 Procedimiento y precauciones inmediatas:

Utilice guantes y lentes de seguridad. En caso de derrame de pequeñas cantidades, puede usar un material absorbente para recolectar al mismo (el producto es biodegradable). Para el caso de grandes derrames regrese a un recipiente el material y disponerlo en el basurero municipal y planta de tratamiento de aguas.



SECCION IX

Protección especial específica.

IX.1 Equipo de protección personal específico.

Valor de control sugerido o TLV (Threshold limit value o valor límite de exposición): No existe un TLV asignado para esta mezcla.

Minimice la exposición de acuerdo con la práctica de higiene del trabajo adecuada.

Ventilación: Se puede usar cualquier tipo de ventilación, de preferencia del tipo mecánico. Se trata de un producto biodegradable.

Ropa de protección: Tome todas las precauciones para evitar el contacto con la piel. Basta con tela de poro abierto de poliéster o algodón. Para personas con piel muy sensible o alérgica, extremar las medidas.

Protección para los ojos: Se recomienda el uso de lentes de seguridad.

Otros equipos de protección: para las manos, se recomienda utilizar guantes de goma, y para la boca y nariz use mascarilla.

SECCION X

Información sobre ecología

X.1 De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos. Por su naturaleza no afecta la fauna microbiológica del suelo.

Persistencia y degradabilidad: Producto Biodegradable

Eco-toxicidad:

Especificidad y efectos sobre organismos no blanco: No se conocen efectos adversos en el hombre, aves, peces, ranas, lombrices de tierra, microorganismos benéficos o plantas de follaje sensible.

En plantas: *Trichoderma*, favorece la descomposición de materia orgánica en los alrededores de la raíz poniendo los nutrientes a disposición de la misma para que ésta los asimile.

En suelo: *Trichoderma* es el hongo beneficioso, más versátil y polifacético que abunda en los suelos. Es un hongo conocido por promover el crecimiento radicular en plantas. No se conoce que dicho microorganismo sea patógeno de ninguna planta; sin embargo, es capaz de parasitar, controlar y destruir muchos hongos, nemátodos y otros fitopatógenos, que atacan y destruyen muchos cultivos; debido a ello, muchos investigadores le llaman el hongo hiperparásito. Ello convierte al *Trichoderma* en un microorganismo de imprescindible presencia en los suelos y cultivos, y de un incalculable valor agrícola.



En agua: *Trichoderma*, es un microorganismo de ocurrencia natural en el suelo. Basados en la revisión bibliográfica, son prácticamente inexistentes las referencias acerca de la recuperación de especies de *Trichoderma* spp. a partir de ambientes acuáticos. Existe una aparente inhabilidad de *Trichoderma* para establecerse en hábitats acuáticos y a la fecha no existen reportes de efectos adversos de este microorganismo en peces y otros organismos acuáticos.

Efectos en aves: No se han reportado efectos adversos en aves, al realizar aplicaciones en campo en pequeñas y grandes extensiones, dado que la exposición de estas al producto es mínima.

Toxicidad en abejas: No se ha encontrado toxicidad de *Trichoderma* en poblaciones de abejas, de hecho existen reportes de literatura en los cuales las abejas han sido empleadas como organismos para la diseminación del hongo.

Efecto sobre benéficos: No existen reportes en la literatura acerca de que *Trichoderma* cause infecciones u otro tipo de efectos adversos en insectos u otros invertebrados. Adicionalmente existen reportes de literatura que indican que especies de ácaros benéficos se alimentan de las hifas del hongo.

SECCION XI

Precauciones especiales:

XI.1. Para el manejo, almacenamiento y disposición de envases

Manejo: La aplicación de SPOLVOTRICH se puede realizar con los métodos de espolvoreo al follaje en cualquier etapa del ciclo del vegetal. Aplicar en horas de la mañana o por la tarde. Utilice agua y un recipiente limpio, libre de residuos de fungicidas.

Utilice coadyuvantes compatibles en caso de ser necesarios. Manténgase el producto fuera del alcance de los niños. No fume o consuma alimentos durante el manejo, mezcla o uso del producto. El uso cuidadoso de cualquier producto es una buena práctica. Se recomienda la aplicación del producto usando una dosis de 5 kg/ha dependiendo del desarrollo de la enfermedad. El producto contiene 2.5×10^8 conidios viables por gramo de producto. El producto es seguro para el ser humano siempre y cuando se use como se indica. Se alcanza una máxima eficiencia si se emplean boquillas de alta nebulización que garanticen un buen cubrimiento sobre el follaje de las plantas. Dirija la aplicación a los sitios donde se desarrolla el ciclo de vida de los fitopatógenos.

Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco lejos de los rayos solares. El calor y el sol pueden afectar la actividad microbiana, de preferencia mantener en refrigeración a 4 °C.

Disposición de envases usados: Luego de haber enjuagado el envase por triplicado éste puede ser desechado en un basurero municipal o llevado a un centro de reciclaje. No reutilice los recipientes.



SECCIÓN XII

OTRA INFORMACIÓN

La información que contiene esta hoja de datos de seguridad, está basada en nuestro conocimiento sobre el producto tanto a nivel de laboratorio como de campo, nuestra amplia experiencia investigativa nos permite proporcionarla. Se recuerda a los usuarios de nuestro producto que el uso del mismo para aplicaciones diferentes para los cuales está diseñado ó aconsejado, puede acarrear eventuales riesgos. Tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes al uso del producto.

SECCIÓN XIII

CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

Producto: Entregar excedentes diluidos con solvente (agua) y material no reciclable a una empresa de eliminación autorizada.

Embalaje contaminado: Deseche como producto no usado

SECCIÓN XIV

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

DOT: No es regulado como mercancía peligrosa.

IATA: No es regulado como mercancía peligrosa.

IMDG: No es regulado como mercancía peligrosa.

SECCIÓN XV

INFORMACIÓN REGULATORIA

Compañía MICROTECH SERVICES CIA. LTDA.: Registro Agrocalidad en trámite

Fecha de Emisión: 22 de enero 2021

Responsable: Jefe de Producción y Control de Calidad de MICROTECH / Dr. Antonio Leon Reyes / aleon@microtech.ec

